

# ISDIN ERYFOTONA® AK-NMSC Fluid

Protège et répare les dommages actiniques



**Protection solaire** pour le visage à usage quotidien indiquée dans la prévention et le traitement **protecteur adjuvant de la kératose actinique (AK)** et d'autres formes de cancer non mélanome (NMSC).

Dispositif médical | 50 ml

Dispositif médical de classe IIA

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ **Haute protection SPF100+ UVB/UVA.**
- ✓ **Contient de la photolyase**, qui est activée par la lumière visible.
- ✓ Réduit et améliore le champ de cancérisation cutanée subclinique.
- ✓ **Réduit l'apparition de nouvelles lésions** de kératose actinique.
- ✓ Efficacité prouvée en **monothérapie<sup>1</sup>** et en complément d'un traitement thérapie **photodynamique<sup>2</sup>** et **cryothérapie<sup>3</sup>**.
- ✓ Hypoallergénique.

## PREUVES SCIENTIFIQUES

### ÉTUDE EN MONOTHÉRAPIE

Efficacité supérieure à celle des protections solaires après 6 mois de traitement, démontrant une réduction significative du nombre de lésions AK et une amélioration de paramètres cliniques BSI et TCS.

### ÉTUDE APRÈS THÉRAPIE PHOTODYNAMIQUE

Réduction du nombre de lésions liées à la qualité de la peau sans avoir recours à des traitements supplémentaires tels que la photothérapie dynamique (PDT) ou d'autres interventions spécifiques.

### ÉTUDE APRÈS CRYOTHÉRAPIE

Réduction de 84 % des lésions KA en 6 mois grâce à la cryothérapie.

Indice BSI Brodsky | Score clinique total TCS | Thérapie photodynamique PDT |

## INGRÉDIENTS

### DNA Repairsomes®

- **Photolyase encapsulée dans des liposomes**  
Enzyme qui réduit et améliore champ de cancérisation subclinique
- **Filtres physiques et chimiques**

## PROFIL CLIENT

- Personnes suivant un traitement ou ayant des antécédents de cancers cutanés non mélaniques (NMSC) ou d'autres formes similaires.
- Personnes à la peau claire et présentant des signes d'accumulation de dommages causés par le soleil.
- Personnes présentant des lésions cutanées dues au soleil, peau squameuse et rugueuse au toucher\*

1. Puig S, Granger C, Garre A, Trullàs C, Sanmartín O, Argenziano G. Revue des preuves cliniques sur 10 ans concernant la prévention et le traitement d'un dispositif médical filmogène. Utilisation de la photolyase dans la prise en charge de la cancérisation de terrain dans la kératose actinique. Dermatol Ther (Heidelb). Juin 2019 ; 9(2) : 259-270. 2. Thérapie photodynamique : Eibenschutz, L., Silipo, V., De Simone, P., Buccini, P. L., Ferrari, A., Carbone, A., & Catricalà, C. (2016). Étude randomisée, en double aveugle, en groupes parallèles, d'une durée de 9 mois, visant à évaluer les effets cliniques d'un agent filmogène. Dispositifs médicaux contenant de la photolyase et des filtres solaires dans le traitement de la cancérisation de champ par rapport aux écrans solaires chez les patients après une p. British Journal of Dermatology, 175(6), 1391-1393. 3. Cryothérapie : Vaño-Galvan S, Jimenez N, Grillo E, Ballester A. Étude observationnelle sur l'efficacité et la sécurité d'emploi de l'association d'un produit topique contenant de la photolyase et la cryothérapie chez les patients atteints de kératoses actiniques dans la pratique clinique (article en espagnol). Piel. 2016;31(8):532-6 \*Renvoyer le patient au dermatologue pour un examen complet.

ROUTINE  
COMPLÈTE

# RECOMMANDATION ERYFOTONA® AK-NMSC Fluid

## ROUTINE DU MATIN



## MODE D'EMPLOI




Appliquer minimum  
deux fois par jour  
(matin et midi).



En cas d'exposition  
directe au soleil, renouv-  
eler l'application.  
**toutes les 2 heures.**

Appliquer  
généreusement  
sur toute la zone  
touchée et sur les  
zones à risque qui  
ont reçu une  
exposition élevée et  
chronique au soleil  
**(comme le visage, le  
front, les oreilles, le  
décolleté, les zones  
dégarnies et le dos  
des mains).**



## ROUTINE DU SOIR



TIPS

## CONSEILS POUR LES CONSOMMATEURS

### CONSEILS DE PRÉVENTION KÉRATOSE ACTINIQUE

- Limitez votre exposition au soleil, en particulier au milieu de la journée.
- Recherchez l'ombre et portez des vêtements protecteurs.
- Appliquez de la protection solaire toutes les deux heures, ou plus fréquemment lorsque vous transpirez ou nagez.
- Évitez les lits de bronzage car ils augmentent le risque de développer un cancer de la peau.
- Vérifiez régulièrement votre peau et consultez un dermatologue si vous remarquez des changements suspects.

La prévention joue un rôle clé car si la kératose actinique n'est pas traitée rapidement, le risque d'évolution vers un carcinome est plus élevé.

Ce risque concerne non seulement les lésions visibles, mais aussi les cellules cutanées endommagées qui peuvent ne pas être visibles à l'œil nu.

### MEILLEUR MATCH !



ERYFOTONA® NIGHT



Prolongez l'action de votre soin  
contre les dommages induits par le  
soleil avec Eryfotona Night, le sérum  
de nuit qui régénère la peau et aide à  
réparer les dommages accumulés au  
fil des expositions solaires.

**ISDIN**  
LOVE YOUR SKIN